

Aracée

Lentille sp

SITUATION ET ÉCOLOGIE

Écologie : Hydrophyte non enracinée, flottantePériode de floraison (en moyenne) :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Période de visibilité : Absence pendant la mauvaise saison.

Lemna minor [9]



Spirodela polyrhiza [9]



Lemna trisulca [9]

CARACTÈRES D'IDENTIFICATION

• Petite lentille d'eau (*Lemna minor*)

Feuilles : Appelées « Frondes » – Fronde solitaire ou par 2-3 – Vertes claires – 2 à 5 mm – 1 racine par fronde – Ovals, presque plate sur les côtés – Nervures peu visibles

• Lentille d'eau à plusieurs racines (*Spirodela polyrhiza*)

Fronde : Verte claire en face supérieure, rouge pourpre en face inférieure – 4 à 10 mm (Grandes) – Plusieurs racines par fronde

• Lentille d'eau à trois lobes (*Lemna trisulca*)

Fronde : Reliée en chaîne ramifiée - Translucides – Lancéolées – 5 à 10 mm

Remarque : la gestion d'une mare avec des lentilles dépendra de l'espèce concernée.

ATTENTION ne pas confondre *Lemna minor* avec *Lemna minuta*, qui est une espèce exotique envahissante. Le fort recouvrement de la surface de l'eau n'indique pas forcément le développement d'une espèce invasive.

Lentille minuscule (*Lemna minuta*) – Espèce exotique envahissante :

Plus petite que la Petite lentille d'eau. Fronde allongée, 1 nervure centrale visible. La distinction avec la Petite lentille d'eau reste difficile.



[9]